



P. J. REDOUTÉ.

Peintre de Fleurs.



Σταφόν ἄν με καὶ λυγρῶ.
 Παρὰ τοῖς Διόνυσσιν, ἤκοις.
 Μετὰ Κρήνης βαθυκόλῳ,
 Ρόδινισι σέφανιςκοις.
 Περικασμένος χορὸν ὄσσω.
Amoreon Ode V.

P. J. Redouté pinxit.

Imprimaria de Rouen.

Charlet sculp.



Rosa Gallica Versicolor.

P. J. Redouté pinx.

Rosier de France à fleurs panachées.

Impression de Roussel

Laugel sculp.

LES ROSES.

135

ROSA GALLICA

Versicolor. (Voyez page 76, var. 25.)

R. Gallica (versicolor) germinibus globosis; foliis magnis et eleganter variegatis; pedunculis hispids; caule et petiolis hispids aculeatis; foliis subovatis, subtus villosis. ANDR. ROS. CUM. fig.

LE ROSIER DE FRANCE

à Fleurs panachées.

DESCRIPTION.

Cette belle variété du Rosier de France s'élève en buisson à la hauteur de deux à trois pieds. Ses tiges sont hérissées d'aiguillons d'inégale longueur, les plus longs crochus, et les plus petits presque droits. Les feuilles se composent de sept folioles oblongues, pointues au sommet, arrondies à la base, glabres en-dessus, tomenteuses en-dessous, glanduleuses en leur bord. Elles sont portées par un pétiole velu, quelquefois un peu aiguillonné; il est muni à sa base de stipules simples, aiguës au sommet, entourées de glandes sessiles. Les fleurs, peu odorantes, naissent en général trois ensemble à l'extrémité des rameaux. Les tubes des calices, presque globuleux, sont hispides ainsi que les pédicelles qui les supportent. Chaque pédicelle, excepté celui du milieu, est muni de deux bractées ovales, le plus souvent foliacées et glanduleuses comme les stipules; deux autres bractées, qui ne sont que des feuilles avortées, se font remarquer au point d'insertion de ces trois pédicelles. Les divisions du limbe, courtes, trois pinnatifides et deux simples, sont pointues au sommet, co-



Rosa alba flore pleno.

P.J. Redouté pinx.

Supermari de Rancoul

Rosier blanc ordinaire.

Langlois sculp.

LES ROSES.

117

ROSA ALBA

(*Flore pleno.* Voyez page 98, var. 1.)

LE ROSIER BLANC.

(*l'année à fleurs doubles.*)

DESCRIPTION.

C'est un arbrisseau rameux, diffus, qui s'élève à une grande hauteur, souvent jusqu'à dix ou douze pieds. Ses rameaux, liasses, d'un verd-tendre dans leur jeunesse, sont munis d'aiguillons épars un peu recourbés. Les pousses de l'année sont presque toujours glabres et dépourvues d'épines. Les feuilles sont composées de cinq ou de sept folioles comme arrondies, d'un verd-sombre en-dessus, plus pâles et pubescentes en-dessous. Elles sont portées par un pétiole seul, muni de quelques petits aiguillons crochus. Les fleurs latérales et terminales sont tantôt solitaires, tantôt réunies par trois ou quatre. Elles sont supportées par des pédoncules ou des pédicelles hérissés de poils glanduleux. Ces poils sont plus rares et par-fois presque nuls sur les ovaires. Les divisions du limbe sont alternativement entières et pinnatifides. La corolle, rarement bien pleine, très-souvent semi-double, d'une odeur particulière à l'espèce et à ses variétés, se compose de pétales blancs, échancrés en cœur au sommet. Ce Rosier, abandonné à lui-même, tend toujours à reproduire des fleurs simples : aussi n'est-il pas rare d'en trouver qui ne présentent que sept à huit pétales. Souvent le bouton de la fleur est légèrement coloré en rose-tendre.

Le Rosier blanc a été figuré dans beaucoup d'ouvrages ; les



Rosa Damascena. subalba.

P. A. Redoute pinx.

Rosier de Damas à Petale teinte de rose.

Superficie de Remond

Chapuy sculp.

LES ROSES.

63

ROSA DAMASCENA.

(SUBALBA.)

R. Calycibus semi-pinnatis, gemmibus ovatis, turgidis, pedunculisque hispidis, caule petiolisque aculeatis, foliis ovatis, acuminatis, subtus villosis. Du Roi. *Hort. herbic.* vol. 2, pag. 369. Arr. Kew. vol. 2, pag. 205, n° 14. *Willd. spec.* 2, pag. 1072.

R. Alba (Damascena) POIRET. Enc. vol. 6, p. 291.

R. Damascena alba? ROESSIG. *Beschreibung der Rosen*, première partie, p. 84.

LE ROSIER DE DAMAS.

(à pétales blancs lavés de rose.)

DESCRIPTION.

Cet arbrisseau présente des buissons touffus qui s'élèvent à la hauteur de trois ou quatre pieds. Les tiges sont armées d'aiguillons inégaux et rougeâtres, les uns droits, les autres recourbés. Les feuilles sont composées de cinq folioles simplement dentées, glabres en dessus, pubescentes et quelquefois colorées en-dessous, supportées par des pétioles velus, glanduleux, munis de quelques aiguillons recourbés. Les fleurs, disposées deux ou trois ensemble à l'extrémité des rameaux, forment, par leur réunion, une espèce de panicule. Elles sont portées par des pédicelles hérissés de poils glanduleux, et munis à leur base de bractées réfléchies et pointues. L'ovaire, renflé vers le milieu, et les lobes allongés, acérés et pinnatifides du calice sont également couverts de poils. Corolle de cinq pétales.



Rosa Hudsoniana Salicifolia Rosier d'Hudson à feuilles de Saule.
P. J. Redouté pinx. *Supplément de Rémont* *Langlois sculp.*

LES ROSES.

95

ROSA HUDSONIANA.

(*R. Germinalis* globosis pedunculisque glabris; foliis simpliciter serratis; petiolis villis subaeatis; laciniis calycinis integris corollam impertam superantibus; caule inermi, floribus corymbosis. (N.)

(*R. SALICIFOLIA*.)

R. foliis oblongis, acutis, impunct majori. (N.)

R. Corymbosa (de la baie d'Hudson). Du Port, choix des Roses, etc. p. 5. *R. Carolina corymbosa*. Ejusd. Catal. inédit, série 29, n° 238.

LE ROSIER D'HUDSON.

(Variété à feuilles de saule.)

DESCRIPTION.

Ce Rosier que M. Du Port a communiqué, a été par lui-même confondu avec le Rosier de la Caroline, et par d'autres

(1) *Habitus*. FRUTUS 2-3, pedalis, erectus, inermis. FOLIOLA plerumque quina, rarius septena, elongata, supra viridia, subtus glaucescentia, simpliciter et nunquam iterum serrata. PETIOLI undique villosi, aculeis recurvis minimis 2-3, saepe, praediti. STIPULAE conduplicatae, apice subdentatae, margine pilosae. PEDUNCULI, corymbosi vel cymosi, glabri, in pedicellos 5-6, divisi. PERICELLI subglabri duabus bracteis ad basin suffulti. BRACTEAE ovato lanceolatae margine ciliato. TUBUS CALYCIS glaberrimus, aliquando nonnullis setis glandulosis tectus saepe glaber. LACINIIS calycinis integerrime apice dilatatis, corollam superantes, intus et margine pilosae, extus glanduloso-lanugineae. PALLAS 5, cordato-emarginatae, antum purpureae, basi flavoscentes. STAMINA numerosissima. STAMINA rubra, in capitulum sessile.

Proxima *R. Alpestris*, sed diversa 1° foliis simpliciter serratis: 2° petiolis plerumque aculeatis: 3° stipulis non dilatatis, sed conduplicatis: 4° floribus Corymbosis. *R. Carolina* discrepat à *Rosa Hudsoniana* aculeis stipularibus: Rosa autem *Elonensis* differt caulibus primi anni aculeis rectis subreflexis tenuibus aequatis, floribusque albis.



Rosa Cinnamomea flore simplici. Rosier de Mai à fleurs simples.

P. J. Redouté pinx.

Supplément de Remond.

Charlet sculp.

LES ROSES.

133

ROSA CINNAMOMEA

Flore simpli. (Voyez ci-après var. «.)

LE ROSIER DE MAI

à Fleurs simples.

DESCRIPTION.

Arbrisseau qui s'élève en buisson à la hauteur de quatre ou de cinq pieds. Les rameaux florifères sont lisses et absolument glabres; les tiges adultes sont pourvues, dans leur partie inférieure, d'une multitude d'aiguillons courts, presque droits, très-rapprochés entre eux. Les feuilles se composent de sept folioles ovales simplement dentées, glabres en-dessus, légèrement pubescentes en-dessous, sur-tout sur les nervures. Les fleurs, odorantes, plusieurs ensemble à l'extrémité des rameaux, forment, par leur réunion, une espèce de corymbe. Le tube du calice est presque globuleux, glabre, ainsi que le pédoncule qui le supporte. Les divisions du limbe sont très-longues. Corolle de cinq pétales échancrés en cœur, plus ou moins colorés en rouge, selon l'exposition de l'arbrisseau. Stigmates réunis en tête. Ce Rosier fleurit en mai; il croît spontanément dans le midi de l'Europe.

Description spécifique et Nomenclature des variétés de cette espèce.

R. CINNAMOMEA.

R. Germineux globaux pedunculati; glabris; foliolis simpliciter dentatis; calice aculeato; ramis erectis fusco-purpureis, praenatis; stygnatibus subsessilibus. (N.)

Ces Rosiers, depuis qu'ils sont soumis à la culture, ont subi, dans nos jardins, des modifications qui ont donné lieu à l'établissement de plusieurs espèces par quelques nota-



Rosa bifera officinalis.

P. J. Redouté pinx.

Rosier des Parfumeurs.

Infirmerie de Remond.

L'anglais sculp.

LES ROSES.

107

ROSA BIFERA

(*Officinalis*. Voyez, ci-après, var. r.)

LE ROSIER DES PARFUMEURS.

DESCRIPTION.

Les tiges de ce Rosier s'élèvent en un buisson assez peu fourni à la hauteur de quatre à cinq pieds. Elles sont munies d'aiguillons un peu rougeâtres, inégaux, les plus longs recourbés. Les feuilles se composent de trois ou de cinq folioles ovales, la plupart pointues au sommet, simplement dentées, d'un verd gai en-dessus, plus pâles et pubescentes en-dessous comme sur les bords, mais dépourvues des poils glanduleux qu'on remarque sur les bordures des folioles du Rosier à cent feuilles; elles sont portées par un pétiole velu, muni, à la base, de quelques petits aiguillons crochus et de stipules bifides et glanduleuses. Les fleurs, très-odorantes, sont portées par des pédoncules écartés les uns des autres, et non rapprochés et érigés comme dans le *Bifera vulgaris*. Le tube du calice, hérissé de poils rougeâtres surmontés de glandes visqueuses, se confond dans le pedoncule qu'on ne distingue que par les poils plus serrés et plus roides dont celui-ci est couvert. Les divisions du limbe sont pinnatifides, allongées, spatulées et souvent lobées au sommet. Corolle de quatre à cinq rangs de pétales échancrés en cœur et d'une jolie couleur rose.

Cette variété, connue sous le nom de Rosier de Puteaux, est celle que l'on emploie le plus ordinairement aux usages de la parfumerie.